

# LIDOCAÍNA KLONAL

## LIDOCAÍNA CLORHIDRATO

Inyectable  
Venta bajo receta

Industria Argentina

K-27/1

### FÓRMULA:

Cada 100 ml de solución contiene:

#### LIDOCAÍNA KLONAL 1% y 2%

Lidocaína clorhidrato ..... 1g/2g

Excipientes: Cloruro de sodio, agua para inyectables, c.s.

#### LIDOCAÍNA KLONAL 1% y 2% (con epinefrina)

Lidocaína clorhidrato ..... 1g/2g

Epinefrina ..... 0,5 mg

Excipientes: Cloruro de sodio, ácido cítrico anhidro, metabisulfito de sodio, agua para inyectables, c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Anestésico local.

### POSOLOGÍA:

#### Lidocaína:

##### Adultos:

Anestesia caudal: analgesia obstétrica y quirúrgica 200 a 300 mg. (20 a 30 ml) de solución 1%.

Anestesia epidural: analgesia lumbar 250 a 300 mg (25 a 30 ml) de solución 1%.

Anestesia lumbar: 200 a 300 mg (10 a 15 ml) de solución 2%.

Anestesia torácica: 200 a 300 mg (20 a 30 ml) de solución 1%.

Infiltración percutánea: 5 a 300 mg (0,5 a 30 ml) de solución 1%.

Bloqueo de nervios periféricos: Dental 20 a 100 mg (1 a 5 ml) de solución 2%.

Intercostal: 30 mg (3 ml) de solución 1%.

Paracervical: 100 mg (10 ml) por lado de solución 1%.

Paravertebral: 30 a 50 mg (3 a 5 ml) de solución 1%.

Pudenda: 100 mg (10 ml) por lado de solución 1%.

**Dosis límite:** no debe exceder de 4,5 mg por kg de peso o 300 mg por dosis excepto en:

Anestesia regional intravenosa: no debe exceder de 4 mg por Kg de peso.

Dental: no debe exceder de 6,6 mg por kg de peso o 300 mg por aplicación dental.

#### Dosis Pediátrica:

Infiltración local: No superior a 4,5 mg por Kg de peso.

Anestesia regional intravenosa: No superior a 3 mg por Kg de peso.

Bloqueo de nervios: No superior a 4,5 mg por Kg de peso.

#### Lidocaína y Epinefrina:

**Adultos:** La adición de epinefrina permite la administración de dosis mayores, que con Lidocaína sola.

**Dosis límite:** 7 mg de Clorhidrato de Lidocaína por kg de peso pero sin exceder los 300 mg por dosis simple.

**Dosis pediátrica:** Según criterio médico.

**Dosis pediátrica límite:** 7 mg de Clorhidrato de Lidocaína por kg de peso.

### ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:

Las acciones colaterales indeseables resultan de niveles plasmáticos elevados por dosis que sobrepasan las máximas aconsejables, por absorción rápida, por administración intravascular inadvertida, por dosis excesiva o por tolerancia reducida de los pacientes debido a idiosincrasia o hipersensibilidad.

Son incidencias raras o poco frecuentes: Visión doble, borrosa, convulsiones, mareos, zumbidos en los oídos, temblores, excitación, somnolencia, erupción en la piel, hinchazón de cara, labios, boca, lengua o garganta, transpiración, pérdida de color de la piel, hipotensión, latidos lentos, o irregulares, náuseas o vómitos.

#### Interacción con drogas:

Antimiasténicos, depresores del SNC, soluciones desinfectantes conteniendo metales pesados, guanetidina, mecamilamina, trimetofan, inhibidores de la MAO, bloqueantes neuromusculares, analgésicos opiáceos, vasoconstrictores, bloqueantes beta-adrenérgicos, cimetidina.

En el caso de Lidocaína mas epinefrina: inhalación de anestésicos hidrocarbonados, antidepresivos tricíclicos, bloqueantes beta-adrenérgicos, droperidol, fenotiazinas, oxitócicos.

### PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

Lidocaína con epinefrina está contraindicada en la anestesia local de manos y pies, punta de nariz, oreja, pene, y en todos los casos en que esté contraindicada la epinefrina.

Lidocaína no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad a anestésicos locales amídicos, en pacientes con shock severo o trastornos de conducción cardíaca, o cuando el lugar de inyección está inflamado y/o infectado.

Debe ser cuidadosamente utilizada si se lo considera indispensable, durante la primera mitad del embarazo, lo que no excluye su uso en analgesia-anestesia obstétrica.

### CONSERVACIÓN:

Entre 8°C y 30°C, al abrigo de la luz.

### SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosificación accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital Ricardo Gutierrez - Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital Posadas - Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde: (011) 4300-2115/4362-6063

Centro Nacional de Intoxicaciones - Tel. 0800-333-0160

### PRESENTACIONES:

Lidocaína Klonal 1%: envases conteniendo 1 y 100 frascos ampolla por 20 ml, 1 y 100 ampollas por 3,5, 5 y 20 ml, siendo las presentaciones por 100 de uso hospitalario exclusivo.

Lidocaína Klonal 2%: envases conteniendo 1 y 100 frascos ampolla por 20 ml, 1 y 100 ampollas por 5 y 20 ml, siendo las presentaciones por 100 de uso hospitalario exclusivo.

Lidocaína Klonal 1% y 2% (con epinefrina): envases conteniendo 1 y 100 frascos ampolla por 20 ml, 1 y 100 ampollas por 5 y 20 ml, siendo las presentaciones por 100 de uso hospitalario exclusivo.

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO DEBE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.074

Director Técnico: Leonardo Iannello  
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 05/1996

Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CVZ)  
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

