

FEKLON

SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO

Jarabe - Solución Oral

Venta bajo receta

Industria Argentina

K-135/J

FÓRMULAS CUALICUANTITATIVAS:

FEKLON SOLUCIÓN ORAL

Cada 100 ml de Solución Oral contiene:

Sulfato Ferroso Heptahidratado.....12,50g.

Sorbitol, Sacarosa, Alcohol etílico 3% P/v, Metabisulfito de sodio, Acido cítrico, Esencia de frutilla,
Agua destilada c.s.

FEKLON JARABE

Cada 100 ml de Jarabe contiene:

Sulfato Ferroso Heptahidratado.....1,80g

Sorbitol, Sacarosa, Alcohol etílico 8% P/v, Metabisulfito de sodio, Acido cítrico, Esencia de frutilla,
Agua destilada c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Suplemento de hierro.

CODIGO ATC: B03AA07

INDICACIONES:

Tratamiento y profilaxis de anemias ferropénicas.

POSOLÓGÍA:

FEKLON SOLUCIÓN ORAL

Dosis terapéutica en niños: 3mg/Kg/día.

Dosis profiláctica en niños: 1mg/Kg/día.

Cada 1 ml de solución equivalen a 33 gotas

DOSIS PROFILACTICA RECOMENDADA				
Edad	Dosis de FEKLON en ml.	Dosis equivalencia en Nº de gotas	Suministra	
			Sulfato ferroso en mg	Hierro mg.
Lactantes y Niños	0,3	10	37,5	7,5
Niños y Mayores	0,6	20	75	15

DOSIS TERAPEUTICA RECOMENDADA				
Edad	Dosis de FEKLON en ml.	Dosis equivalencia en Nº de gotas	Suministra	
			Sulfato ferroso mg	Hierro mg
Lactantes	2,4 a 3,0	79 - 99	300 a 375	60 a 75
Niños de 2 a 6 años	3,0 a 4,2	99 - 139	375 a 525	75 a 105

FEKLON JARABE:

Dosis terapéutica en niños: 3 mg/Kg/día.

Dosis profiláctica en niños: 1 mg/Kg/día.

Dosis terapéutica en niños de 6 a 12 años aproximadamente 24 ml de jarabe.

Dosis profiláctica en niños de 6 a 12 años aproximadamente 8 ml de jarabe.

Equivalencia de FEKLON JARABE: Una dosis, o sea un vasito dosificador (5 ml), equivale aproximadamente a una cucharadita de té colmada y suministra 18 mg de hierro elemental.

ADMINISTRACIÓN:

FEKLON puede tomarse directamente, en el caso de las gotas colocar el gotero en la parte posterior de la lengua, pero preferentemente conviene diluir ambas presentaciones con agua o jugo de frutas alejado de las comidas (1 hora antes o dos horas después). Si aparecieran trastornos gastrointestinales puede tomarse con las comidas o dividir las tomas en dosis menores pero más frecuentes. Las posibles manchas dentales son transitorias, se recomienda el cepillo dental con bicarbonato de sodio o agua oxigenada diluida al 3 %. Un eventual cambio en la coloración del producto, no afecta la calidad del mismo.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al sulfato ferroso, o a cualquier otro componente de la fórmula.

Hemocromatosis, hemosiderosis, asma, hepatitis, anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica. Pancreatitis crónica, hepática y cirrosis hepática. Sensibilidad a las sales de hierro.

PRECAUCIONES:

Administrar con precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal, procesos inflamatorios intestinales. Insuficiencia hepática.

Interacciones medicamentosas: La siguiente lista no exhaustiva debe tenerse presente en tratamientos con hierro, y en caso necesario no administrar conjuntamente con las sales de hierro.

Reducen la absorción de hierro: Antiácidos, suplementos de calcio, huevos, leche y productos lácteos, café, té, cereales y en general productos ricos en ácido fítico, pancreatina y pancreolipasa. El alcohol en uso simultáneo con hierro por periodos prolongados puede dar efectos tóxicos por aumento de los depósitos de hierro.

Los siguientes medicamentos tomados simultáneamente con sales de hierro disminuyen la acción de ambos: ácido acetohidroxámico, ciprofloxacina, penicilamina, tetraciclinas, etidronato, dimercaptol.

Interferencias de diagnóstico: Durante el tratamiento con suplementos orales de hierro se pueden producir las siguientes interferencias de diagnóstico:

- Concentración sérica de bilirrubina, falsamente aumentada.
- Calcemia: falsamente disminuida.
- Prueba de ortotoluidina: falsamente positiva.
- Prueba de glucosa oxidasa: falsos resultados negativos.

Efectos secundarios adversos: La aparición de heces oscuras o verdosas es debido al hierro no absorbido y esto es inofensivo. Trastornos de incidencia mas frecuentes que requieren atención médica: dolor, calambres o inflamación del abdomen y el estómago.

Requieren atención médica si son persistentes: Nauseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

SOBREDOSIS:

No deben desestimarse las posibles intoxicaciones con sales ferrosas, especialmente en niños pequeños. Síntomas de sobredosis aguda:

Diarrea que a veces contiene sangre, fiebre, náuseas intensas, calambres, dolor agudo en estómago y vómitos con sangre.

En caso de sobredosis accidental, consultar inmediatamente al médico o recurrir inmediatamente a los siguientes centros toxicológicos:

Hospital de Pediatría R. Gutierrez al (011) 4962-6666/2247. Hospital Posadas a los telefonos: (011) 4654-6648/4658-7777.

CONSERVACIÓN:

Conservar entre 10º C y 25º C, al abrigo de la luz. Una vez abierto utilizar dentro de las 4 semanas.

Mantener bien cerrado.

PRESENTACIONES:

FEKLON SOLUCION ORAL: Envase de 20 ml conteniendo 1 ó 32 frascos, siendo éste último para uso hospitalario exclusivo.

Envase de 30 ml conteniendo 1 ó 32 frascos, siendo éste último para uso hospitalario exclusivo.

FEKLON JARABE: Envases conteniendo 1 ó 100 frascos por 120 ml, siendo éste último para uso hospitalario exclusivo.

«ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA».

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 51.421

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 04/2004

Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

