

# IBUPROFENO KLONAL

## IBUPROFENO 2%

Suspensión Oral

Uso pediátrico

Venta Libre

Industria Argentina

K-276/B

### FÓRMULA:

Cada 100 ml de suspensión oral contiene:

Ibuprofeno ..... 2,00 g

Excipientes: Azúcar, Sacarina sódica, Carboximetilcelulosa, Dióxido de silicio coloidal, Metilparabeno, Propilparabeno, Tween 20, Esencia de frutilla, Colorante amarillo, Agua purificada, c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Analgésico - Antifebril - Antiinflamatorio.

### USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN:

Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de cabeza y dientes, para resfriados, estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

### COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla.

Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad.

En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

### TABLA DE DOSIFICACION

PESO (Kg)	EDAD (años)	DOSIS
Menos de 11	Menores de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2-3	5,0 ml
16 a 21	4-5	7,5 ml
21 a 27	6-8	10,0 ml
27 a 32	9-10	12,5 ml
más de 32	más de 10	15,0 ml

En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos-antiinflamatorios.

### PRECAUCIONES:

Consulte con su médico en estos casos si:

- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.

- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta eventualidad consulte a su médico.

**Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

### ADVERTENCIAS:

Salvo indicación médica:

No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.

No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor. No utilizar contra el dolor de estómago.

### REACCIONES ADVERSAS:

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

### SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/4962-2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

Centro Nacional de Toxicología: 0800-333-0160

### CONSERVACIÓN:

Conservar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, en su envase original, al abrigo de la luz.

Evitar la exposición a la luz. Mantener bien cerrado.

### PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 1, 96 y 100 frascos por 90 ml con dispositivo dosificador, siendo las presentaciones por 96 y 100 frascos de uso hospitalario exclusivo.

Envases conteniendo 1 y 100 frascos por 200 ml con dispositivo dosificador, siendo la presentación por 100 frascos de uso hospitalario exclusivo.

**ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad medicinal aprobada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 41.042

Director Técnico: Leonardo Iannello  
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 03/2009

Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)  
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

