

RIFAMICINA G

RIFAMICINA SV

Solución tópica dérmica
Venta bajo receta archivada

Industria Argentina

K-231/B

Fórmula cuali-cuantitativa

Solución:

Cada 100 ml contiene:

Rifamicina SV (como sal sódica)500mg
Excipientes autorizados c.s.p100ml

ACCION TERAPEUTICA:

Antibiótico bacteriostático de espectro reducido, que actúa por inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas.

Muy activo contra bacterias gram positivas como el estafilococo, incluido el resistente a los antibióticos, el estreptococo hemolítico beta, el estreptococo hemolítico alfa, el enterococo (*Streptococcus faecalis*), estos dos últimos menos sensible que el primero. El neumococo, el *Bacillus anthracis*, el *Clostridium perfringens*, el *Clostridium septicum*, el *Corynebacterium diphtheriae*. Es bien susceptible el gonococo, algo menos el meningococo y no tanto los bacilos Gram negativos como la *Escherichia coli*, el *Hemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*. Es importante la acción sobre el bacilo de Koch. Posee acción sobre el *Mycobacterium leprae*.

INDICACIONES:

Infecciones causadas por gérmenes sensibles.

Está particularmente indicada en quemaduras, piodermitis, impétigo, úlceras varicosas y heridas infectadas.

Infecciones del sitio operatorio: en tratamientos de apoyo de la antibioterapia general.

En cirugía ortopédica y traumatológica, otorrinolaringológica, maxilofacial y abdominal.

DOSIFICACION:

Infecciones cutáneas: 3 a 4 aplicaciones diarias. La dosis puede incrementarse si es necesario.

Cirugía: instilación en el sitio operatorio o en el foco infeccioso.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga.

Uso en el embarazo y lactancia:

No existen estudios para determinar la inocuidad de la rifamicina durante el embarazo.

Por lo tanto el médico debe balancear los beneficios de la administración de la droga con los riesgos potenciales para la madre y el feto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

El uso tópico prolongado puede ocasionar sensibilización. En infecciones causadas por estreptococo beta hemolítico debe comprobarse la desaparición completa de los gérmenes para evitar complicaciones alejadas.

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden presentarse reacciones alérgicas cutáneas. Cuando se administra tópicamente puede producirse irritación local. No se ha observado reacción cruzada con otra familia de antibióticos.

PRESENTACIONES:

Solución tópica dérmica: 1 y 21 frascos de 22 ml, siendo este último de uso hospitalario exclusivo.

CONSERVACIÓN:

Entre 15° C y 30° C al abrigo de la luz.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45238

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 06/1996