

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:
 Amilorida Clorhidrato.....5 mg
 Hidroclorotiazida.....50 mg
 Almidón de maíz, laca amarillo oca, estearato de magnesio, almidón pregelatinizado, lactosa anhidra, almidón glicolato, lauril sulfato de sodio, c.s. PVPK30.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Diurético con acción natriurética y ahorradora de potasio.

INDICACIONES:

Agente diurético antihipertensivo que impide la pérdida excesiva de potasio natural en presencia o en ausencia de aldosterona. Coadyuvante en estados edematosos o de hipertensión, cuando se desea un efecto diurético ahorrador de potasio. Edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática con ascitis, síndrome nefrótico, hipertensión.

CONTRAINDICACIONES:

Amiloridor no debe usarse en: Presencia de niveles elevados de potasio en el plasma (mayor de 5,5 mEq/l). Pacientes que reciben otros agentes ahorradores de potasio o de suplementos de potasio. Función renal deteriorada (anuria, insuficiencia renal aguda, enfermedad renal progresiva severa y nefropatía diabética). Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de este producto o a otros medicamentos sulfonamídicos.

POSOLÓGIA:

Hipertensión: La dosis recomendada usualmente es de 1 a 2 comprimidos diarios en una sola dosis o en dosis repartidas. Algunos pacientes pueden requerir solo medio comprimido por día. La dosis puede ser incrementada si es necesario hasta 4 comprimidos diarios.

Edema de origen cardíaco: La dosis recomendada inicialmente es de 1 o 2 comprimidos diarios, subsecuentemente puede ser ajustado si es requerido pero la dosis no puede ser mayor a 4 comprimidos diarios. La dosis óptima es determinada por la respuesta diurética y el nivel de concentración plasmático de potasio. Iniciada la diuresis, se puede reducir la dosificación para el tratamiento de mantenimiento.

Cirrosis hepática con ascitis: Se recomienda comenzar el tratamiento con una dosis baja de 1 comprimido, la cual puede ser incrementada gradualmente hasta alcanzar una diuresis efectiva. No se recomienda administrar dosis mayores a 4 comprimidos diarios. Las dosis de mantenimiento pueden ser menores a la dosis requerida para iniciar la diuresis; la reducción de la dosis debe ser contemplada cuando el peso del paciente ha sido estabilizado. Una reducción gradual del peso es especialmente deseable en pacientes con cirrosis para reducir la probabilidad de reacciones adversas asociados a la terapia diurética.

Pediatría: No se recomienda el uso en Niños.

Uso en adultos mayores: Se recomienda precaución debido a la mayor susceptibilidad al desbalance electrolítico; la dosis debe ser cuidadosamente ajustada a la función renal y a la respuesta clínica. La dosis de mantenimiento puede ser baja hasta obtener una diuresis. El tratamiento debe iniciarse con una dosis pequeña de AMILOCLOR (1 comprimido una vez al día) y aumentar si fuera necesario. Las dosis de mantenimiento pueden ser menores a las iniciales para reducir la posibilidad de reacciones desfavorables asociadas con la terapia diurética.

PRESENTACIÓN:

Envases con 30 y 1000 comprimidos, siendo esta última para uso hospitalario exclusivamente.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente entre 15° C y 30° C, y en su estuche original. Evitar la exposición a la luz.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. **Certificado N°:** 49.688.
Director Técnico: Leonardo Iannello, Farmacéutico.



Amilorida 5 mg + Hidroclorotiazida 50 mg

AMILOCLOR

Amilorida 5 mg + Hidroclorotiazida 50 mg

AMILOCLOR



LíneaFarmacias

LíneaInstituciones

KLONAL
 LABORATORIOS
 COMPROMETIDOS CON TU SALUD

Comercial:
 Av. Ortiz de Ocampo 3302 - módulo III, PB. Of. 5. - CABA, Argentina (C1425DSU)
 Tel. Fax. (54 11) 4801-5110 (Rot.)

Administración:
 Lamadrid 669 - Bernal - Prov. de Buenos Aires, Argentina. (B1876BIG)
 Tel. Fax. (54 11) 4251-1354 (Rot.)

Planta Industrial:
 Lamadrid 802 - Quilmes - Prov. de Buenos Aires, Argentina. (B1878CVZ)
 Tel. Fax. (54 11) 4251-5954 (Rot.)

www.klonal.com.ar


DIURETICO ANTIHIPERTENSIVO AHORRADOR DE POTASIO

KLONAL
 CARDIOLOGIA
 COMPROMETIDOS CON TU SALUD

Amilorida 5 mg + Hidroclorotiazida 50 mg

AMILOCLOR

Indicado para tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca



Se produce entre la 2ª y la 4ª hora, logrando efectos diuréticos máximos a la 4ª hora, con acción prolongada durante 12 hs.

La acción retentiva del potasio, por el clorhidrato de amilorida, se obtiene dentro de las dos primeras horas y alcanza su máxima actividad entre la 6ª y la 10ª hora.

Se obtienen entre la 3ª y la 4ª hora, y la semi-vida plasmática oscila entre la 6ª y la 9ª hora.



Comprimidos ranurados

Ahorrador de potasio (amilorida)
+
Diurético tiazídico (hidroclorotiazida)



- La administración concomitante de ambos fármacos tiende a equilibrar la eliminación de potasio y potenciar la acción diurética
- Actúa reduciendo la cantidad de agua en el cuerpo, al aumentar el flujo de orina
- Aumenta la excreción urinaria de ión sodio