

LUAR G COMPOSITUM

HIOSCINA BUTILBROMURO + DIPIRONA (METAMIZOL SÓDICO)

Inyectable - Comprimidos recubiertos - Gotas - Supositorios

Venta bajo receta

Industria Argentina

K-29/K

Cada comprimido recubierto contiene:

Hioscina N-Butilbromuro 10 mg
Dipirona (metamizol sódico)250mg

Excipientes: Lactosa/Celulosa, povidona K-30, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio. Recubrimiento (Opadry II): Alcohol polivinílico, polietilenglicol 3350, talco, dióxido de titanio, c.s.

Cada 100 ml de solución (gotas) contiene:

Hioscina N-Butilbromuro667 mg
Dipirona (metamizol sódico)33,340g

Excipientes: Ciclamato sódico, sacarina sódica, fosfato monosódico monohidrato, fosfato disódico dihidratado, alcohol etílico (9.6% p/v), agua para inyectables, c.s.

Cada ampolla contiene:

Hioscina N-Butilbromuro 20 mg
Dipirona (metamizol sódico) 2,500 mg

Excipientes: Metabisulfito de sodio, agua para inyectables, c.s.p. 5 ml

Cada supositorio para adulto contiene:

Hioscina N-Butilbromuro 10 mg
Dipirona (metamizol sódico) 1,000 g

Excipientes: Polietilenglicol 1540, polietilenglicol 4000, agua destilada, c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Espasmolítico - Analgésico

INDICACIONES:

Cólicos hepáticos, cólicos renales, todos los estados espasmódicos intensamente dolorosos de los órganos digestivos, vías biliares y urinarias. Estados espasmódicos de los órganos genitales femeninos, dismenorrea, dolores post - operatorios.

POSOLOGÍA:

Comprimidos recubiertos: 1 o 2, 3 veces al día. Deben ser ingeridos enteros.

Gotas:

Adultos: 1,5 ml, 3-4 veces al día.

Niños en edad escolar: 0,75 ml, 3-4 veces al día.

Niños pequeños de más de 1 año: 0,38 ml, 3 veces al día.

Ampollas: En estado espasmódico intenso, una ampolla intramuscular profunda o intravenosa lenta (5 min). Nunca subcutánea ni intraarterial.

Supositorios: 1 supositorio, en caso necesario puede repetirse esta dosis varias veces al día, con intervalos de 2 a 4 horas.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS :

Dipirona + N-Butilbromuro de hioscina está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la Dipirona u otros derivados de pirazonas. No debe utilizarse tampoco en pacientes con alteraciones hematológicas y/o que presenten evidencias de depresión medular.

En raras ocasiones puede producir reacciones de hipersensibilidad. La reacción más seria es la reducción o desaparición de glóbulos blancos, por lo tanto si se presenta un deterioro inesperado de la condición del paciente, si aparece o reaparece fiebre y/o dolor de garganta de origen desconocido, suspender inmediatamente el medicamento y consultar al médico.

Shock alérgico es otra reacción grave y rara, sus primeros síntomas son: prurito, sudoración fría, mareos, náuseas, dificultad para respirar; si ellos se presentan, acudir al médico. Hasta que el mismo llegue, asegurarse de que el paciente permanezca acostado, con las piernas levantadas y las vías aéreas despejadas.

Usar con precaución especial durante el embarazo y la lactancia, en lactantes, niños, en insuficiencia renal o hepática y en pacientes con historia de úlcera péptica o enfermedades sanguíneas. Como todos los analgésicos-antiinflamatorios inyectables, Dipirona + N-Butilbromuro de hioscina debe usarse por esa vía el tiempo mínimo indispensable que determine el médico, y retornar lo más pronto posible a la forma oral.

Es recomendable y seguro administrar la forma inyectable en lugares provistos e idóneos para tratar prontamente el shock alérgico grave.

No usar la vía parenteral en glaucoma de ángulo estrecho, íleo, retención urinaria, megacolon y taquiarritmias.

GOTAS:

Advertencias:

No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con Disulfiram

Precauciones:

Basado en la presencia de Alcohol etílico como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas y niños.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede presentar constipación.

CONSERVACIÓN:

Conservar entre 8 °C y 30 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

PRESENTACIÓN:

Comprimidos recubiertos: Envases con 10, 20, 50, 500 y 1000 comprimidos recubiertos, siendo las dos últimas para uso hospitalario exclusivo.

Ampollas: Envases con 1, 6 y 100 ampollas, siendo el último para uso hospitalario exclusivo.

Gotas: 1 y 32 frascos de 20 ml, siendo el último de uso hospitalario exclusivo.

Supositorios: Envases con 6 supositorios.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Cert. N° 42.898

"ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA"

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 12/1993

Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

 **KLONAL**
LABORATORIOS