

KLONAFENAC®

Diclofenac dietilamina

Gel

ANTIINFLAMATORIO
ANALGESICO

GEL DERMICOX 50 g

Venta libre
Industria Argentina

INFORMACION DEL MEDICAMENTO: Lea detenidamente esta información.

Fórmula: Cada 100 gramos contiene: Diclofenac dietilamina 1,16 g, equivalente a 1 g de Diclofenac sódico, Excipientes c.s: Imidazolil urea, Polímero del ácido acrílico (Carbopol 940), Trietanolamina, Alcohol etílico 96%, Agua destilada.

PRESENTACIONES:

Pomos por 50 y 100 gramos. Envases conteniendo 1 pomó.

INDICACIONES:

Tratamiento local del dolor y aceleración del proceso de recuperación de la función normal en los casos de inflamación traumática o reumática ocasionada por golpes, contusiones, torceduras y esguinces, dolores musculares, dolor de cuello y espalda, dolor reumático, inflamación de tendones y ligamentos.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Adultos y niños mayores de 12 años: según la extensión del área afectada, aplique frotando suavemente 2 g a 4 g, 3 a 4 veces al día. Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis recomendada.

Luego de finalizada la aplicación lavarse las manos con abundante agua.

SI LOS SINTOMAS PERSISTEN DESPUES DE 7 DIAS, CONSULTE A SU MEDICO.

CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO FRENTE A CUALQUIER DUDA QUE SURGIERE DEL USO DE ESTE MEDICAMENTO.

VIA DE ADMINISTRACION:

Tópica.

REACCIONES SECUNDARIAS:

Ocasionalmente reacciones locales como dermatitis de contacto, prurito (comezón o picazón), enrojecimiento, erupción o ardor. Si estas se presentan, suspenda su uso y consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia o hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquier otro componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroides.

PRECAUCIONES:

Solo para uso externo. No ingerir. No aplicar en los ojos, mucosas, ni en la piel irritada o heridas abiertas.

Embarazo y lactancia: Consulte a su médico. No usar en mujeres embarazadas o en periodo de amamantamiento.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conservar a una temperatura entre 8°C y 30°C, debe mantenerse al abrigo de la luz.

SOBREDOSIS:

Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 4962-6666/2247, Hospital de Niños Pedro Elizalde 4301-2115, Hospital Posadas 4658-7777/4654-6648.

Especialidad Medicinal aprobada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº 51.703

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 11/2007

KLONAFENAC®

Diclofenac dietilamina

Gel

- ESGUICES
- DESGARROS
- TENDINITIS
- DOLORES MUSCULARES
- REUMATISMO
- ARTROSIS
- ARTRITIS

www.desinflamate.com.ar

Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

 **KLONAL**
LABORATORIOS